



Dow AgroSciences

11



Примена: RUNNER 240 SC је инсектицид са контактним и дигестивним деловањем који се користи:

1) У засаду јабуке, за сузбијање јабукног смотовца (*Cydia pomonella*) у концентрацији од 0,04-0,06% (4-6 ml на 10 l воде), на почетку пильења првих гусеница, уз утрошак 1.000 l/ha воде (10 l на 100 m²);

2) У засаду винове лозе, за сузбијање сивог гроздовог смотовца (*Lobesia botrana*) у концентрацији од 0,03-0,05% (3-5 ml на 10 l воде), пре почетка убушивања гусеница у бобице уз утрошак 600-1.000 l/ha воде (6-10 l на 100 m²);

Начин примене: фолијарна примена прскањем или орошавањем апаратима за третирање са земље.

Максималан број третирања: 2 пута на истој површини у току године.

Третирање из ваздухоплова: није дозвољено.

Напомена: Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

Негативно деловање:

На воде: Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотоци, језера, бунари, изворишта вода и водоснабдевање), дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у водотокове, третирајући најмање 20 м удаљено од њих.

Каренца: 14 дана-јабука, винова лоза

Радна каренца: обезбеђена сушењем депозита

Мешање: не сме се мешати са Bordovskom čorbom и препаратима алкалне реакције.

Припрема препарата за употребу: Одмерену количину препарата сипати у резервоар прскалице који је 2/3 испуњен водом. Уз непрестано мешање додати преосталу количину воде.

Усклађиштење: Препарат чувати у неотвореној и неоштећеној амбалажи у сувој просторији где нема предмета за људску и сточну исхрану, нити предмета опште употребе.

Реч упозорења: Није применљиво

Обавештење о опасности: Није применљиво

Обавештење о мерама предострожности: Није применљиво

Додатно обележавање: ЕУН401 - Придржават се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

Додатна ознака безбедности: SP1: Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом; Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода; Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

Произвођач:Dow AgroSciences, Austrija

Заступник и дистрибутер: Agromarket doo
Крагујевац, Краљевачког батљона 235/2
034/308-000



Поступак чишћења уређаја за примену: Остатке средства за прскање разредити водом у односу 1:10 I и применити на третирану површину док је укључена мешалица. Добро испрати резервоар прскалице, испразнити цев и дизне чистом водом 3 пута(троструко испирање). Физички уклонити све видљиве наслаге. Очистити дизне и филтере. Цео систем испрати чистом водом, напољу на местима где средство не може доспети на површинске воде и где нема опасности за људе и животиње.

У случају просипања препарата: Не дозволити приступ невлачилићима лицима. Одговарно лице, на прописан начину на обавезу да обележи место негоде и обавести надлежни орган инспекције или најближу станицу полиције. Спречити да се расути садржај шире, контактира земљиште или да доспе у канализацију, систем за дражку или било коју другу воду. Пажљivo почистити и пропустити материјал покупити користите инертни материјал (песак, вермикул или пиљевину) и одложити у посебне контејнере за одлагање.

Начин испирања амбалаже: поступање са остатцима средства за заштиту биља и испражњеном амбалажом: Садржај амбалаже се најпре испразни у резервоар прскалице и остави да се оцеди 30sec затим се дода вода до 1/3 запремине амбалаже. Амбалажу затворити и садржај склони промуштаваји, тако да вода дође до свих унутрашњих површина. Затварач амбалаже се скине и пусти да вода којом је испрвично испираје исури у резервоар уређаја за примену и амбалажа се остави 30sec да се исцеди. Овај поступак поновити још 2 пута, с тим да се сваки пут користи чиста вода. Испрани амбалажу пропуштити на 3 места и тако је учинити неупотребљивом. Испирање амбалаже се такође може вршити коришћењем специјалног расправљача који се налази на уређајима за примену и то на следећи начин: дно и бочни зид амбалаже се пробуши и на то место се привичти специјални расправљач-дизна уређај за примену средства за заштиту биља. Кроз ту дизну (расправљач) пропустити воду у трајању од 30sec. По завршеном испирању, оставити амбалажу да се оцеди и пропуштити на 3 места да се учини неупотребљивом.

Амбалажу испрати одмах након пракњења. Испирање амбалаже се такође може вршити коришћењем ПРАЗНА АМБАЛАЖА СЕ НЕ СМЕ КОРИСТИТИ У ДРУГЕ СВРХЕ!

Са неутрошеним количинама и амбалажом поступити у складу са Законом о управљању отпадом (сл.гл РС 36/09)

Механизам деловања: Механизам токсичног деловања није познат. Ради се о отровима са малим степеном токсичности, који не испљава специфично или селективно деловање на неки од органа или организних система.

Симптоми тровања: За већину наведених отровних материја нису описане тровања код људи. На основу података о токсичности на експерименталним животињама и скромним података о акутним тровањима људи, зна се да могу да изазову неке опште симптоме и знаке тровања, као што су гађење, мука, малаксалост, глабовоља а некада и повраћање. Ови отрови изазивају и црвенило и свраб коже и иритацију слузница очију и дигестивног тракта, што се манифестишу црвенилом конјуктива и сузењем, хиперсалвацијом, гребањем у гушци и болом у трбуху.

Права помоћ и лечење: У пероралним тровањима треба изазвати повраћање и лаважу желуца, а у перкутаним се препоручује купање и пресвлачење. Лечење је симптоматско. У случају тровања, обавезно се јавити надлежном лекару и понети ово упутство. Лекар може консултовати токсиколога у Центру за контролу тровања ВМА, Црнотравска 17, Београд, тел: 011/2662-381 или 3608-440, ради добијања детаљних информација, стручне консултације и препорука за даљи третман затрованог.

Дозвола за промет издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Београд бр. 321-01-00021-192/2008-11 од 18.03.2008.г. са свим важећим изменама и допунама.

Рок употребе: 3 године
Датум производње и број шарже:
утиснути на паковању



8 605032 600970